Hyménoptères Tenthrédinides récoltés au Japon par M. J. Harmand,

par M. F.-W. Konow.

(deuxième mémoire.)

Tenthredo fuscoterminata Marlatt.
Rhogogastera variipes Kirby (*Tenthredo variipes* Kirby 1882).
Allantus pictus Motschulsky 1866 (*nec* André 1881, *nec* Klug 1814).
— Kohli Konow.
Athalia japonica Klug (Tenthredo [Allantus] japonica Klug. 1813).
Hylotoma Jonasi Kirby.
— similis Vollenhoven.
Xyphidria Buyssoni Konow ♀.
Tremex longicollis Konow ♀.
Sirex japonicus Smith ♀ ♂.
— antennatus Marlatt ♀.

Sont restés indéterminables des *Hylotoma, Dolerus, Emphytus, Macrophya* et *Pachyprotasis.*

Hyménoptères Formicides, récoltés au Japon par M. J. Harmand,

par M. Ernest André.

(troisième mémoire.)

Camponotus ligniperdus Latreille var. obscuripes Mayr. ♀ ♂.
— marginatus Latreille; mâle.
— pennsylvanicus Degeer var. japonicus Mayr. ♀ minor.
Formica sanguinea Latreille; femelle.
— fusca Linné var. nipponensis Forel; femelle.
— rufa Linné race truncicola Nylander; femelle.
Lasius niger Linné race alienus Förster; femelle et ouvrière.
Solenopsis fugax Latreille; ouvrières.

Reste indéterminable une ouvrière de *Pheidole.* Les espèces de ce genre nombreuses et difficiles ne peuvent pas ordinairement être reconnues en l'absence du soldat.
